

Kapelle, juni 2009

Teelttechnisch bericht nr. 4

Zwarte roest in Engels raaigras

Op enkele percelen Engels raaigras, die circa 3 weken geleden zijn gespoten, is zwarte roest geconstateerd. Uit ervaring is bekend dat vooral eerstejaars diploïde gewassen vatbaar zijn voor zwarte roest. Vaak is een tweede bespuiting noodzakelijk.

Blijf de percelen goed volgen! De aantasting komt vooral voor op de stengel en op de aar, dus niet op het blad, zie foto. De kleur is bruin, het komt voor in kleine haarden en kan snel uitbreiden als de temperatuur tussen de 20 en 25°C is.

Bespuiting:

Als u 3 tot 4 weken na de eerste bespuiting zwarte roest constateert, altijd 0,25 tot 0,5 l/ha Corbel gebruiken. Afhankelijk van de tijdsduur tussen 2e bespuiting en de verwachte maaidatum kunt u ook nog een halve dosering Matador of Tilt toevoegen. Let hierbij op de veiligheidstermijnen, overleg zonodig met uw teeltadviseur.



Bestrijding van akkerdistels en melde

Voor de bestrijding van akkerdistels en eventueel overgeschoten melde kan na de bloei gespoten worden met circa 2-2,5 l/ha MCPA. Dit kan worden gemengd met fungiciden.